

A Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).

A transmissão pode ocorrer por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou ser transmitida para a criança durante a gestação e parto, podendo apresentar consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênicas precoces ou tardias e/ou morte do recém-nascido (RN).

A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, sendo a única droga com eficácia documentada durante a gestação. Considera-se tratamento adequado para a gestante o uso de penicilina benzatina na dosagem de 2.400.000 UI para casos de sífilis recente e 7.200.000 UI para casos de sífilis tardia.


O tratamento do parceiro juntamente com a gestante é crucial para o sucesso terapêutico bem como para a prevenção da transmissão da sífilis para o bebê.

O Brasil, assim como muitos países, apresenta uma reemergência da doença. Diante disso, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e adequado da sífilis adquirida, em gestantes e sífilis congênita, são determinantes para impactar na redução da morbimortalidade.

CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA
7

Sífilis Adquirida - Segundo Sexo


N=07



■ Masculino ■ Feminino

Sífilis em Gestante - Tratamento do Parceiro

N=1




■ IGN/Branco ■ Sim ■ Não

CASOS DE SÍFILIS EM GESTANTE
1


Sífilis em Gestante - Esquema de Tratamento

N=1



Sífilis em Gestante - Momento de diagnóstico

N=1



CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO
0

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulga o Boletim Epidemiológico Anual da Sífilis em CATUJI – de janeiro a outubro de 2023. Segundo dados extraídos do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) municipal, foram reportados sete casos de sífilis adquirida no período em questão, sendo dois do sexo masculino e cinco em do sexo feminino, além de um caso de sífilis em gestante. Não foram detectados casos de sífilis congênita.

A Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, podendo apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).

A transmissão ocorre por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação e parto, levando ao risco de consequências severas, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênicas precoces ou tardias e/ou morte do recém-nascido (RN). O tratamento é crucial para o sucesso terapêutico bem como para a prevenção do contágio para o bebê.

A Organização Mundial de Saúde estima que sejam diagnosticados pelo menos um milhão de novos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia e, dentre elas, uma que chama muita atenção é a sífilis. (Secretaria de Vigilância em Saúde - BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE). Diante disso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da sífilis adquirida, em gestantes, e sífilis congênita, são determinantes para impactar na redução da morbimortalidade.

Importante ressaltar que a SMS oferta, através do SUS, testagem para diagnóstico de sífilis e outras ISTs. Procure sua unidade de saúde mais próxima e se informe.

DIA NACIONAL de COMBATE à SÍFILIS

20 de outubro

O QUE É

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Pode se manifestar em três estágios. Os maiores sintomas ocorrem nas duas primeiras fases, período em que a doença é mais contagiosa. O terceiro estágio pode não apresentar sintoma e, por isso, dá a falsa impressão de cura da doença.

FORMAS DE CONTAGIO

A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante o sexo sem camisinha com alguém infectado, através de sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou o parto.

PREVENÇÃO

O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento durante a gravidez são meios simples, confiáveis e baratos de prevenir-se contra a sífilis.

DIAGNÓSTICO

Avaliação clínica, testes rápidos e exames laboratoriais. Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes, pois a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto e/ou morte ao nascer.

#FAÇAOTESTE



BOLETIM INFORMATIVO ANUAL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS

SETOR DE VIGILÂNCIA E SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OUTUBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023

TOTAL DE TESTES RÁPIDO REALIZADOS		739
TOTAL COM REAGENTES		14
HOMENS	05	MULHERES 09
GESTANTES		02

SÍFILIS NÃO

FAÇA AQUI OS TESTES RÁPIDOS
SEGURO, RÁPIDO E GRATUITO

HIV
SÍFILIS
HEPATITE B
HEPATITE C

ENCARE A SÍFILIS
DANONIA & MENÇA E
CAMINHO PARA A CURA.

COMO SABER SE TENHO SÍFILIS?
Procure um serviço de saúde e faça um exame. Ele é simples, rápido e gratuito.

A SÍFILIS TEM CURA!
Com exame e tratamento corretos, a cura é total. Há diagnóstico e tratamento em todos os serviços públicos de saúde.

SÍFILIS CONGÊNITA
É quando a sífilis é transmitida de mãe para filho, caso não seja realizado o diagnóstico e tratamento da doença durante a gestação. A doença acarreta inúmeros problemas de saúde ao bebê ou abortamento. Toda mulher grávida deve fazer pré-natal e realizar o exame para sífilis na "Consulta ao Primeiro da gestação, de ser positivo, a mãe e o parceiro devem fazer o tratamento para evitar a contaminação do bebê.

FAÇA O PRÉ-NATAL COM SEU PARCEIRO
É importante ambos realizarem o exame e o tratamento, para seu bebê não nascer com sífilis. Lembre-se que todo bebê precisa ser levado a uma Unidade de Saúde na primeira semana de vida.

O QUE É SÍFILIS?
É uma infecção sexualmente transmissível (IST). Quando não tratada, ela acarreta graves prejuízos à saúde.

QUEM PODE TER SÍFILIS?
Qualquer pessoa que tenha mantido relações sexuais desprotegidas sem o uso de preservativo. A sífilis também pode ser transmitida aos bebês na gravidez.

COMO SE PREVENIR?
Use camisinha em todas as práticas sexuais (oral, anal, vaginal). A camisinha (masculina ou feminina) deve ser colocada desde o início da relação sexual.

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS?
Um dos primeiros sinais da doença é uma pequena ferida (chamada de chancra) na pele, na vagina, ânus ou boca. A ferida costuma desaparecer após alguns dias, mesmo sem tratamento. Entretanto, a bactéria causadora da doença continua viva na corrente sanguínea. Se a sífilis não for tratada corretamente, após alguns meses ela pode voltar a se manifestar, com manchas em várias partes do corpo, principalmente nas palmas das mãos e solas dos pés. Estes sintomas também desaparecem sem tratamento, porém a doença continua avançando. Quando não identificada e tratada, a sífilis pode provocar cegueira, paralisia, doenças neurológicas e problemas no coração.

OUTUBRO VERDE

Mês de combate à Sífilis Congênita

FAÇA O teste gratuito de sífilis

Se devidamente diagnosticada e adequadamente tratada, a sífilis não passará para o seu bebê

